





PUNKY BALL

Dianthus

GREEN BALL® PUNKY

Cuttings

Una de las flores cultivadas más antiguas del mundo, el Dianthus es considerada la "Flor de los Dioses" o una flor divina. Simboliza pasión, fascinación, admiración, afecto, amor y gratitud.

- De los que introdujeron el único "Green Ball®" llega el NUEVO Punky Ball
- Punky Ball: Juvenil y rebelde. Sus puntas despeinadas le otorgan una energía irresistible para aquellos que quieran dar un paseo por el lado salvaje.
- Mayor productividad que otros en el mercado, menos del 8% de reproductivos.

BallSB



INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS
De siembra a cosecha: 16 semanas

DENSIDAD DE SIEMBRA
42 plantas/m^2 neto (3-4 plantas/pie^2 neto)

PRE-SIEMBRA
Substrato: Se recomienda sembrar en camas con cascarilla quemada y no reutilizarla.
pH: 5.6 a 6.5
Malla: 2 niveles

PINCH
Se realiza en la cuarta semana, dejando 2-3 pares de hojas verdaderas. Si la planta no tiene el largo suficiente, realice el pinch un semana después.

SELECCIÓN DE TALLOS
Se inicia en la semana 6-8 dependiendo del desarrollo de la planta. Seleccionar los 3 mejores tallos. El criterio de selección debe ser el grosor y vigor del tallo. Si hay tallos reproductivos, se eliminan. Dos semanas después es recomendable realizar un repaso de esta labor.

DESBROTES LATERALES
Semanalmente y a medida que los tallos crecen hay que retirar los brotes laterales que salen de los entrenudos

RIEGO
Durante las primeras 3 semanas se recomienda mantener la humedad del suelo homogénea y a capacidad de campo, realizando riego con poma de acuerdo a las condiciones atmosféricas y al muestreo organoléptico. El riego por goteo se puede iniciar al momento de la siembra o 7 días después, aplicando un volumen de 4 - 5 l/m2/día; dependiendo de las condiciones atmosféricas y la capacidad de retención del suelo. El suelo no debe llegar a la condición de saturación.

FERTILIZACIÓN
Una fórmula general de fertilización puede ser:

N: 120 ppm; P: 40 ppm; K: 160 ppm; Ca: 120 ppm; Mg: 60 ppm; S: 50 ppm; Fe: 2 ppm: Mn: 2.5 ppm: Cu, Zn y B: 0.2 ppm.
Realice una fertilización adicional durante la semana 8-9 con la siguiente formula:
K: 200 – 220 ppm
Ca: 220 ppm.
EC: 1.0 to 1.4

COSECHA
Cosecha cuando las cabezas de las flores estén bien formadas y cuando su diámetro sea de 8 cms. No permita que la flor se pase. Cosechar inmediatamente cuando la cabeza se encuentre formada.

POST-COSECHA
Usar AVB (0.5cm3 /Lt de agua). El pH después de aplicar el AVB debe estar entre 7 y 8. Mezclar muy bien y adicionar AVB Booster (1 cm3/Lt de agua). Una vez mezclado, el pH debe quedar entre 3,5 y 5,5. Mantener la flor en esta soluciòn durante 4 horas. Luego hidratar por 4 horas en CHRYSAL PROFESSIONAL 2 (10 cm3/Lt de Agua). Una vez mezclado, el pH debe quedar entre 3,5 y 5,5.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
- Minador (principalmente cuando la planta es joven)
- Thrips sp
- Fusarium sp.
- Afidos