

Brassica Oleracea

Seeds Plugs

COL ORNAMENTAL
SERIE CRANE FEATHER





De la cocina hasta su florero, el repollo ornamental le da una forma de rosa a los arreglos. Originarias de Europa, estas plantas de clima frío producen una roseta redondeada con color en las puntas de sus hojas onduladas. Agrega un toque de blanco o rojo a los arreglos junto con tonalides verdes.

- Una mirada distinta a las Brassicas, esta serie tiene hojas aserradas
- El primer repollo ornamental con hojas bicolor tipo plumas aserradas que crecen muy parejas
- Agrega textura y un toque diferente a los bouquets
- Centro rosa-púrpura en la pluma reina y centro blanco y verde para la pluma rey.

BaliSB

COLORES:



King White



Queen Red



Feather Snow

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS
De siembra a cosecha: 14 semanas.

DENSIDAD DE SIEMBRA
80 plants/m^2 neto (8 plantas/pie^2).

PRE-SIEMBRA
Suelo: Suelto y bien drenado, al menos 25 cms de profundidad.
pH: 5.5 a 6.5
Malla: 2 niveles.

SIEMBRA
Utilice plántulas bien enraizadas con 2 a 3 de hojas verdaderas y no más alto de 5 cm de longitud. Si la plántula se encuentra enlongada, siembre a mayor profundidad hasta el cotidelón para que crezca derecha.

TEMPERATURA
Las temperaturas nocturnas inferiores a 13 ° C (55 ° F) durante 2 semanas producen una buena coloración. Tenga en cuenta que el nitrógeno promueve el crecimiento verde y reduce la intensidad del color de las flores.

DESHOJE
Es necesario adelgazar las hojas después del trasplante. Retire de 8 a 10 hojas de la parte inferior del tallo cuando las plantas tengan de 15 a 20 hojas verdaderas. Retire las hojas de 3 a 4 veces durante el ciclo de cultivo.

RIEGO
Después de la siembra, inicie con riego de poma por 4 semanas para humedecer el suelo homogéneo de acuerdo a la muestra del suelo organoléptico.

Comience 5-7 días después de la siembra. la cantidad de agua dependerá de las condiciones ambientales, la evaporación y la transpiración. Durante las primeras 6 semanas fertilizar y regar completamente (5,0-5,5 l /m^2 /día). En la semana 7, reduzca la fertilización al 50-100% según la fertilización del suelo. Además, para tener tallos más delgados y cabezas más apretadas, reduzca el riego al 50%.

FERTILIZACIÓN
Inicie 1 semana después de la siembra y continue fertilizando hasta la semana 7.

Una formula general de fertilización puede ser:

N: 80 ppm; P: 40 ppm; K: 160 ppn; Ca: 120 ppm; Mg: 60 ppm; S: 50 ppm; Fe: 2 ppm; Mn: 2.5 ppm; Cu, Zn y B: 0.2 ppm.

EC: 1 to 1.3 dS/cm

COSECHA
Coseche cuando las cabezas se encuentren bien formadas y las hojas muestren buen color.
Corte los tallos y remueva las hojas inferiores si es necesario, dejando únicamente 2 a 3 hojas externas en la parte superior.

POST-COSECHA
Solución inicial de Chrysal 0,3 gr/litro. Una vez mezclado, el pH debe quedar entre 3,5 y 5,5. Mantener en esta solución por 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Cutworm
Babosas
Afidos