






Brassica Oleracea



COL ORNAMENTAL
WHITE LADY

De la cocina hasta su florero, el repollo ornamental le da una forma de rosa a los arreglos. Originarias de Europa, estas plantas de clima frío producen una roseta redondeada con color en las puntas de sus hojas onduladas. Agrega un toque de blanco o rojo a los arreglos junto con tonalides verdes.

- **White Lady es muy versátil como flor focal – su centro verde con bordes mas oscuros y brillantes proveen buen contraste con otras flores**

- **Hojas muy blancas con un borde verde oscuro a la orilla de las hojas le da a este repollo ornamental un aspecto único.**

Ball SB



INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS
De siembra a cosecha: 14 semanas.

DENSIDAD DE SIEMBRA
80 plantas/m^2 net (8 plantas/pie^2)

PRE-SIEMBRA
Suelo: Suelto y bien drenado, al menos 25 cms de profundidad
pH: 5.5 a 6.5
Malla: 2 niveles

SIEMBRA
Utilice plántulas bien enraizadas con 2 a 3 hojas verdaderas y no más alto de 5 cm de longitud. Si la plántula se encuentra enlongada, siembre a mayor profundidad hasta el cotidelón para que crezca derecha.

TEMPERATURA
Las temperaturas nocturnas inferiores a 13 ° C (55 ° F) durante 2 semanas producen una buena doración. Tenga en cuenta que el nitrógeno promueve el crecimiento verde y reduce la intensidad del color de las flores.

DESHOJE
Es necesario adelgazar las hojas después del trasplante. Retire de 8 a 10 hojas de la parte inferior del tallo cuando las plantas tengan de 15 a 20 hojas verdaderas. Retire las hojas de 3 a 4 veces durante el ciclo de cultivo.

RIEGO
Después de la siembra, inicie con riego de poma por 4 semanas para humedecer el suelo homogéneo de acuerdo a la muestra del suelo organoléptico.

Comience 5-7 días después de la siembra. la cantidad de agua dependerá de las condiciones ambientales, la evaporación y la transpiración. Durante las primeras 6 semanas fertilizar y regar completamente (5,0-5,5 l /m^2 /día). En la semana 7, reduzca la fertilización al 50-100% según la fertilización del suelo. Además, para tener tallos más delgados y cabezas más apretadas, reduzca el riego al 50%.

FERTILIZACIÓN
Inicie 1 semana después de la siembra y continue fertilizando hasta la semana 7.

Una fórmula general de fertilización puede ser:

N: 80 ppm; P: 40 ppm; K: 160 ppn; Ca: 120 ppm; Mg: 60 ppm; S: 50 ppm; Fe: 2 ppm; Mn: 2.5 ppm; Cu, Zn y B: 0.2 ppm.

EC: 1 to 1.3 dS/cm

COSECHA
Coseche cuando las cabezas se encuentren bien formadas y las hojas muestren buen color.
Corte los tallos y remueva las hojas inferiores si es necesario, dejando únicamente 2 a 3 hojas externas en la parte superior.

POST-COSECHA
Solución inicial de Chrysal 0,3 gr/litro. Una vez mezclado, el pH debe quedar entre 3,5 y 5,5. Mantener en esta solución por 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Cutworm
Babosas
Afidos