



# Anémone

SERIE MONA LISA



Seeds



Plugs

Anémone, también conocida como Poppy Anemone, proviene de la palabra griega que significa "la hija del viento". Esta flor que se cultiva principalmente en primavera está asociada con la llegada de la brisa primaveral, transportándote al calor y la felicidad que se produce cuando las estaciones cambian del invierno frío a la primavera cálida, colorida y con brisa.

Una de las únicas variedades de semillas de anémone.

Fácil y programable

Perfecta para las actuales tendencias suaves y elegantes.

## COLORES:



Bicolor Red




Deep Blue Improved



Wine White Bicolor



Pink



Scarlet Eye



White

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CICLOS

De siembra a cosecha: 12 semanas

### DENSIDAD DE SIEMBRA

22-44 plantas/m<sup>2</sup> neto (2-4 plantas/ ft<sup>2</sup>.)

### PRE-SIEMBRA

**Suelo:** Bien drenado, suelto y con una superficie bien nivelada. Al menos 25 cm (10 pulgadas) de profundidad.

**pH:** 6.0 to 7.0

### RIEGO

El crecimiento adecuado de las anémonas requiere riego frecuente.

No permita que el suelo se seque cuando las plantas estén pequeñas.

Riegue a diario, una vez que se establecen las plantas, la frecuencia de riego se puede disminuir a 2 a 3 veces por semana.

### FERTILIZACIÓN

Durante las semanas previas a la inducción floral, mantenga una relación de N:K = 2:1.

A medida que comienza la producción de flores, disminuya el aporte de N en forma de nitrato e incremente la cantidad de potasio para obtener tallos más fuertes.

C.E: 1.4

### TEMPERATURA

La temperatura promedio después de la siembra debe estar entre 15 ° C y 18 ° C (60 ° F a 65 ° F) durante el día y 13 ° C (55 ° F) en la noche.

### COSECHA

Coseche un día después de que la flor haya abierto. Coseche en la mañana, cuando la flor y el tejido vegetal todavía están fríos. Para optimizar la vida de florero, elimine el calor generado en el campo moviendo las ramas cosechadas a un cuarto frío.

### POST-COSECHA

Siempre use baldes limpios con agua fría y fresca. No despache flores que vienen del campo sin enfriarlas. Para aumentar la vida útil del florero, hidrátelo con una solución de sacarosa al 3% durante 24 horas después de la cosecha.

### PLAGAS Y ENFERMEDADES

Afidos  
Thrips  
Botrytis  
Slugs  
Rhizoctonia

Es susceptible a las fitotoxidades. Siempre realice una prueba fito.